

# La diagnosi prenatale


Esistono due tipi di diagnosi prenatale:

## La diagnosi prenatale diretta

- Invasiva (amniocentesi, villocentesi...)
- È riservata a particolari casi clinici
- Offerta in caso di diagnosi prenatale indiretta positiva

## La diagnosi prenatale indiretta

- Non è invasiva (prelievo ematico, ecografia)
- È un test di screening
- È offerta a tutte le donne in epoca gestazionale adeguata che non hanno fattori di rischio come l'età materna (>35aa) o familiarità per Sindrome di Down, Trisomia 13-18-21



## La diagnosi prenatale a Chieri

Il punto nascita di Chieri offre l'esecuzione della diagnosi prenatale indiretta o non invasiva.

Seguono ulteriori informazioni in merito alla diagnosi prenatale non invasiva.

### *Cosa si intende per test di screening?*

Il test di screening prenatale, nell'ambito del percorso nascita, fornisce informazioni sul rischio individuale per la donna gravida di essere portatrice di un figlio affetto da alcune malattie come: la trisomia 18, la trisomia 21, la trisomia 13 ed i difetti del tubo neurale.

Sottoponendosi ai test di screening si ottiene dunque una informazione sulla condizione di rischio, e non una diagnosi. Esistono diversi tipi di screening:

## IL TEST INTEGRATO

### *In che cosa consiste?*

Si eseguono due prelievi ematici a distanza di quattro settimane, durante il primo incontro viene anche valutata ecograficamente la translucenza nucale (spessore tra la

cute e la colonna del feto).

### *Quando si esegue?*

Il primo prelievo e l'ecografia si eseguono tra l'11° e la 13° settimana di epoca gestazionale.

Il secondo prelievo invece si esegue tra la 15° e la 17° settimana di epoca gestazionale.

### *Quali sono le finalità?*

Unendo i valori ottenuti dal prelievo ematici, dall'ecografia e valutando alcuni fattori come l'età materna si ottiene una stima del rischio di avere un figlio affetto dalla Trisomia 13, 18, 21 oppure da difetti del tubo neurale.

## IL TEST COMBINATO

### *In che cosa consiste?*

Si esegue un prelievo ematico ed un'ecografia per la valutazione della translucenza nucale (spessore tra la cute e la colonna del feto)

### *Quando si esegue?*

Il prelievo e l'ecografia si eseguono tra l'11° e la 13° settimana di epoca gestazionale.

### *Quali sono le finalità?*

Unendo i valori ottenuti dal prelievo ematico, dall'ecografia e valutando alcuni fattori come l'età materna si ottiene una stima del rischio di avere un figlio affetto dalla Trisomia 13, 18, 21.

A differenza del test integrato non si hanno informazioni in merito ai difetti del tubo neurale.

## IL TRI TEST

(In genere viene offerto quando la gravidanza è ad un'epoca gestazionale non più adeguata per l'esecuzione del test integrato)

### *In che cosa consiste?*

Si eseguono un prelievo ematico e la valutazione ecografica del diametro bipartietale (una misura relativa alla testa del feto) e del femore.

### *Quando si esegue?*

L'esame si esegue tra la 15° e la 18° settimana di epoca gestazionale.

### *Quali sono le finalità?*

Unendo i valori ottenuti dal prelievo ematico, dall'ecografia e valutando alcuni fattori come l'età materna si ottiene una stima del rischio di avere un figlio affetto dalla Trisomia 13, 18, 21 oppure da difetti del tubo neurale.

### Cosa fare prima di sottoporsi a diagnosi prenatale indiretta

- Pesarsi la sera precedente l'esame
- Non è necessario il digiuno
- Non applicare oli e creme sull'addome (7 giorni prima dell'esame)
- Portare l'Agenda di Gravidanza con le impegnative 04 e 05 compilate in ogni campo, firmando il consenso al test dietro l'impegnativa 05
- Portare prima la ecografia se già eseguita

### Modalità di prenotazione dei test di screening

Telefonare al numero 011-94294279

Nei giorni: da lunedì al venerdì

Dalle h 13.15 alle h 15.15

Al momento della prenotazione telefonica è necessario essere a conoscenza del giorno dell'ultima mestruazione.

### Consegna dei referti

DOVE?

2° piano, reparto di Ostetricia

QUANDO?

Il martedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 15.00

Il venerdì dalle 08.30 alle 10.00

(Le informazioni riportate sono state tratte da LINEE GUIDA SIEOG ed. 2011)